коготков, количество анальных щетинок) новый подвид, по нашему мнению, занимает промежуточное положение между *L. eweri eweri* и *L. eweri thailandiae*.

Cruz J. Los Acaros de la Subfamilia Lawrencarinae (Acari: Ereynetidae) Parasitos de los Batracios de Cuba // Inst. biol. Acad. cienc. Cuba. Ser. Poeyana.— 1971.— **86**.— P. 1—9.

Fain A. Nouvelles observations des acariens de la famillie Speleognathidae parasites des-fosses nasales chez les batraciens, les oiseaux et les mammifères // Ann. Parasitol.— 1956.— **31**.— P. 643—662.

Fain A. Sur la position systématique de Riccardoella eweri Lawrence, 1952 et de Boydaia angelae Womerslys, 1953. Remaniement de la famille Ereynetidae Oudemans, 1931 // Rev. Zool. Bot. Afr.— 1957.— **55**.— P. 249—252.

Fain A. Observations sur les acariens de la sous-famille Lawrencarinae (Ereynetidae, Trombidiformes). Note preliminaire // Bull. et Ann. Soc. R. Entomol. de Belgique.— 1961.— **9/10**.— P. 245—255.

Fain A. Les Acariens parasites nasicoles des Batraciens. Revision des Lawrencarinae Fain, 1957 (Ereynetidae): Trombidiformes) // Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belgigue.— 1962.— **38**.— P. 1—69.

Lawrence R. F. A new parasitic mite from the nasal cavities of the South African toad Bufo regularis Reuss.// Proc. Zool. Soc. London.— 1952.— **121**.— P. 747—752.

Womersley H. A new genus and species of Speleognathidae (Acarina) from South Australia // Trans. R. Soc. S. Austr.— 1953.— **76**.— P. 82—84.

Институт зоологии АН Украины
(252601 Киев)

Получено 20.06.90

Новий підвид Lawrencarus eweri (Ereynetidae, Lawrencaridae) із Забайкалля. Заблудовська С. А.— Вестн. зоол., 1992, № 3.— *L. eweri dahuricus* ssp. n. описано з Борзянського р-ну Читинської обл., долина р. Борзі, ур. Аршан, Забайкалля, Російська Федерація. Хазяїн — *Bufo raddei*. Голотип самка, паратипи 2 самці, німфа, личинка. Від номінативного підвиду відрізняється хетотаксією анального регіона, склеротизацією кокс, розмірами та формою тарсальних кігтиків. Типи зберігаються в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН України (Київ).

A New Subspecies of Lawrencarus eweri (Ereynetidae, Lawrencaridae) from Transbaikalia. Zabludovskaya S. A.— Vestn. zool., 1992, N 3.— *L. eweri dahuricus* ssp. n. is described from Borzyansky region, Chita district, Borzya river valley, Arshan, Transbaikalia, Russian Federation. Host: *Bufo raddei*. Holotype female, paratypes 2 males, nymph, larva. Distinct by anal area chetotaxy, coxae sclerotization, tarsal claws shape and size. Types are deposited in Schmalhausen Institute of Zoology, Ukrainian Academy of Sciences (Kiev).

УДК 595.787 SESIIDAE

О. Г. Горбунов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛЕКТОТИПОВ БАБОЧЕК-СТЕКЛЯННИЦ (LEPIDOPTERA, SESIIDAE) ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

В результате обработки коллекционного материала по бабочкам-стеклянницам (Lepidoptera, Sesiidae) из собраний Зоологического института Академии наук России и Зоологического Музея Киевского университета им. Т. Г. Шевченко были обнаружены ранее необозначенные типы некоторых видов. В настоящей статье мы приводим оригинальное написание, современное биноминальное название, полные данные этикеток и фиксацию обнаруженного типового материала.

© О. Г. ГОРБУНОВ, 1992

За любезно предоставленную возможность работать с коллекционным материалом выражаю искреннюю благодарность сотрудникам ЗИНа И. Л. Сухаревой и А. Л. Львовскому, а также сотруднику Зоологического Музея КГУ И. Ю. Костюку.

I. Зоологический институт Академии наук России (Санкт-Петербург)

1. *Trochilium przewalskii* Alpheraky, 1882=*Sesia przewalskii* (Alpheraky, 1882) лектотип ♂; рукописная этикетка (черными чернилами на белой бумаге, рукой Алфераки) "Tian-Chian, 12.VIII.1874, Alpheraky"; лектотип обозначен рукописной этикеткой на желтой бумаге: "Lectotypus ♂ / przewalskii Alpheraky / design. O. Gorbunov, 1991"; 2 ♀ паралектотипы с этикетками "Tian-Chian, 12 и 15.VIII.1874, Alpheraky" также обозначены этикетками на желтой бумаге.

2. *Sciapteron tabaniforme* var. *kungessana* Alpheraky, 1882=*Paranthrene tabaniforme* ssp. *kungessana* (Alpheraky, 1882): лектотип ♂: рукописная этикетка (черными чернилами на белой бумаге, рукой Алфераки) "Tian-Chian, 24.V.1874, Alpheraky"; лектотип обозначен рукописной этикеткой на желтой бумаге: "Lectotypus ♂ / kungessana Alpheraky / design, O. Gorbunov, 1991"; ♀ паралектотип с этикеткой "Tian-Chian", 26.V.1874, Alpheraky" также обозначен этикеткой на желтой бумаге.

3. *Dipsosphecia lactea* Filipjev, 1931=*Bembecia lactea* (Filipjev, 1931): лектотип ♂: печатная этикетка «Памир, с.-в. берег оз. Каракуль, 6.VII.<19>28, Рейхардт»; рукописная этикетка (черными чернилами на белой бумаге, рукой Филипьева) "Dips. lactea Fil. Type / N. Filipjev det."; золотой кружок; лектотип обозначен рукописной этикеткой на желтой бумаге: "Lectotypus ♂ / lactea Filipjev / design, O. Gorbunov, 1991"; ♀ паралектотип с этикеткой «Памир, с.-в. берег оз. Кара-куль, 6.VII.<19>28, Рейхардт» также обозначен этикеткой на желтой бумаге.

4. *Dipsosphecia strandi* Kozhanschikov, 1936=*Bembecia strandi* (Kozhanschikov, 1936); лектотип ♂: печатная этикетка «окр. Минусинска, 14.VI.1933, Кожанчиков»; рукописная этикетка (черными чернилами на белой бумаге, рукой Кожанчикова) "Dipsosphecia strandi, Typus"; золотой кружок; лектотип обозначен рукописной этикеткой на желтой бумаге: "Lectotypus ♂ / strandi Kozhanschikov / design. O. Gorbunov, 1991"; ♀ паралектотип с этикеткой «окр. Минусинска, 8.VII.1933, Кожанчиков» также обозначен этикеткой на желтой бумаге.

5. *Sesia allantiformis* Eversmann, 1844=*Chamaesphecia masariformis* (Ochsenheimer, 1808): лектотип ♂: рукописная этикетка (черными чернилами на белой бумаге, рукой Эверсманна) "Spask, 29.VI"; печатная этикетка "coll. Eversmann", лектотип обозначен рукописной этикеткой на желтой бумаге: "Lectotypus ♂ / allantiformis Eversmann / design. O. Gorbunov, 1991"; 2 ♀ паралектотипы с этикетками "Spask, 26.VI", "allantiformis Evm." и "coll. Eversmann" также обозначены этикетками на желтой бумаге.

6. *Sesia guriensis Emich* von Emoke, 1872=*Chamaesphecia guriensis* (Emich von Emoke, 1872): лектотип ♂: печатные этикетки "Grusia" и "coll. Erschoff"; лектотип обозначен рукописной этикеткой на желтой бумаге: "Lectotypus ♂ / guriensis Emich von Emoke / design. O. Gorbunov, 1991" ♀ паралектотип с этикетками "Grusia" и "coll. Erschoff" также обозначен этикеткой на желтой бумаге.

Кроме отмеченных выше типов, в данной коллекции хранятся необозначенные голотипы следующих таксонов: *Trochilium timur* Grum-Grzhimailo, 1893=*Sesia timur* (Grum-Grzhimailo, 1893); *Sesia dioctriiformis* Romanoff, 1884=*Euhagena palariformis* (Lederer, 1858); *Sesia serica* Alpheraky, 1882=*Synanthedon serica* (Alpheraky, 1882); *Sesia velox* Fixen, 1887=*Synanthedon velox* (Fixen, 1887); *Dipsosphecia romanovi* Bartel, 1902=*Bembecia pontica* (Staudinger, 1891); *Sciapteron fervida* var. *transcaucasicum* Staudinger, 1891=*Bembecia pontica* ssp. *transcaucasicum* (Staudinger, 1891); *Sesia chrysidiformis var. turanica* Erschoff, 1874=*Bembecia turanica* (Erschoff, 1874). Голотипы обозначаются рукописными этикетками на красной бумаге.

II. Зоологический Музей Киевского университета им. Т. Г. Шевченко

1. *Dipsosphecia kalavrytana* Sheljuzhko, 1924=*Bembecia albanensis* (Rebel, 1918): лектотип ♀ : рукописная этикетка (черными чернилами на белом печатном бланке "coll. L. Sheljuzhko", рукой Шелюжко) "Kalavryta, (Morea s.) ca. 800 m, 9.VIII, 1919, L. Sheljuzhko leg."; рукописная этикетка (черными чернилами на белой бумаге, рукой Шелюжко) "kalavrytana Shel. (typ.) ♀"; лектотип обозначен рукописной этикеткой на желтой бумаге: "Lectotypus /kalavrytana Sheljuzhko / design. O. Gorbunov, 1987"; паралектотип ♀ с этикеткой "Kalavryta, (Morea s.) ca. 800 m alt., 7.VIII.1919, L. Sheljuzhko leg." также обозначен этикеткой на желтой бумаге.

Кроме обозначенных выше типов, в данной коллекции хранятся голотипы (в оригинальном описании — «монотипы») следующих таксонов: *Synanthedon martianovi* Sheljuzhko, 1918; *Chamaesphecia ferganae* Sheljuzhko, 1924; *Dipsosphecia ninae* Sheljuzhko, 1935=*Bembecia tshimgana* (Sheljuzhko, 1935); *Dipsosphecia tshimgana* Sheljuzhko, 1935=*Bembecia tshimgana* (Sheljuzhko, 1935); *Synanthedon chorogi* Sheljuzhko, 1943=*Chamaesphecia mutilata* (Staudinger, 1887) и *Chamaesphecia infernalis* Sheljuzhko, 1935. Голотипы обозначаются рукописными этикетками на красной бумаге.

Институт эволюционной морфологии
и экологии животных им. А. Н. Северцова
АН России (117071 Москва)

Получено 15.07.1991

ЗАМЕТКИ

Полевая мышь Apodemus agrarius Pall. (Rodentia, Muridae) на о. Кунашир — ♂ juv., заболоченная долина вблизи Южно-Курильска, 3-й км дороги к пос. Отрадному, 1-я декада сентября 1990 г. (промеры в мм: L 88, Ca 69, Pl 19,6, Au 11,8). Шкурка и череп — в Зоологическом музее МГУ. При обширном — панпалеарктическом — ареале этот вид не известен из Японии, с о. Сахалина и с Курильских о-вов. Находка на Кунашире связана, вероятно, с завозом на остров сельскохозяйственной продукции из Приморья.— **С. В. Межжерин** (Институт зоологии АН Украины, Киев).

Новая находка землеройки Neomys anomalus, занесённой в Красную книгу Украины.— Тушка самца малой куторы (17,9 г, длина тела 80, длина хвоста 59 мм, семенники увеличены; череп: КБД — 21,1, ОДЧ — 21,5, ШЧ — 11,0, ВЧ — 6,5, СШ — 5,2, МГШ — 4,2, ДВРЗ — 9,8, ДНРЗ — 9,2 мм) была обнаружена в молодых сосновых насаждениях на берегу пруда в с. Усичи Луцкого р-на на Волынской обл. 23.03.89 г. Ранее на территории области данный вид регистрировался лишь в более северных (полесских) районах. Распространение малой куторы в данной местности связано с наличием прудов и защитных лесополос на их берегах. Таким образом, создание искусственных водоёмов с последующим залеснением берегов и формированием на их базе зооценозов пойменного типа способствует сохранению и распространению редких и исчезающих видов животных.— **Я. А. Омелько-вец, Р. И. Лихотоп** (Институт зоологии АН Украины, Киев).

Cricetulus migratorius в Буджакской степи (Украина).— Ареал серого хомячка стремительно сокращается с запада и имеет разрыв в западном Причерноморье. Зарегистрирована наиболее южная находка вида в северной петле ареала — Придунайской низменности, окр. с. Траповки на восточном побережье оз. Сасык: 1 ♂ subad, 21.05.1989, край пшеничного поля на границе с неудобьями. В общей сложности на плакорах в окрестностях Сасыка в 1989—1991 гг. на 280 ловушко-суток добыто 15 *Sylvaemus sylvaticus*, 5 *Microtus arvalis*, 10 *M. rossiaemeridionalis*, 23 *Mus musculus* и 1. *C. migratorius*. Следовательно, численность вида составляет здесь 0.36 экз/100 л. с., а его доля в отловах — 1.85 % от общего числа особей других видов.— **А. А. Федорченко** (Заповедник «Дунайские плавни», Вилково).